

Памятка пчеловоду по профилактике отравлений пчел пестицидами и агрохимикатами

Установить факт гибели пчел должна комиссия. В ее состав входят: ветеринарный специалист, пчеловод (владелец пасеки) и представитель местной администрации (депутат).

По результатам обследования пострадавшей пасеки комиссия составляет акт, в котором подтверждается достоверность гибели пчел, указываются обстоятельства возможного отравления, размер нанесенного ущерба в натуральных показателях по его составляющим, число и вид отобранных и направляемых в лабораторию проб для исследования, предполагаемая причина гибели и предложения комиссии по восстановлению пасеки, возможном порядке возмещения ущерба, связанного с отравлением (через суд или по соглашению сторон).

В лабораторию отбирают пробы от 10% пчелиных семей пасеки, имеющих характерные признаки отравления. Средняя проба от пчелиной семьи включает: пчелы (свежий подмор) 400-500 шт. в полиэтиленовом мешке, кусочек сота с напрыском - 200г и пыльца-перга в соте 50 г, в деревянном ящике соответствующего размера без обертывания бумагой. Кроме того, с участка, посещаемого пчелами, необходимо взять пробу растений в количестве 500-1000 г зеленой массы, в матерчатом мешочке. При упаковке необходимо исключить повреждение упаковочного материала, чтобы избежать соприкосновения и перемешивания проб во время пересылки. Каждую пробу опечатывают, нумеруют и проставляют номер пчелиной семьи. С сопроводительным направлением, в котором указывают номенклатурное название препарата или группы соединений, к которым относится пестицид, предположительно вызвавший отравление, пробы отправляют в лабораторию в течение первых двух суток с момента отбора. При затруднении с отправкой пробы хранят в холодильнике или погребе, но не более 5-7 суток.

Чтобы защитить своих питомцев, пчеловоду необходимо:

- уточнить список всех пестицидов, применяемых юридическими лицами в сельском, в том числе фермерском, лесном, коммунальном и личном (приусадебном) хозяйствах в радиусе 5 км;
- изучить класс токсичности этих препаратов, регламент применения и сроки изоляции пчел;
- убедить население и специалистов хозяйств применять менее токсичные для пчел пестициды (зарегистрированные в Государственном Каталоге пестицидов), соблюдать регламент их применения, и оповещать пчеловодов (за 4-5 суток, но не менее чем за двое суток) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его использования;
- после получения сообщения о предстоящих обработках, вывести пасеку в безопасное место (за 5-7 км) или произвести изоляцию пчел на месте на срок, определенный классом опасности препарата, при этом сроки изоляции увеличивают на 1-2 дня при понижении температуры и повышении влажности воздуха относительно принятых в данной местности норм, а также при содержании пчел в теплицах, где проводятся обработки. После истечения времени детоксикации растений открывают летки у 1-2 семей: если в течение 2-3 часов лета признаки токсикоза у пчел не появляются, открывают летки у всех семей;
- (вариант-1) изоляцию пчел на месте проводить за сутки до применения пестицида, с гнезд удаляют утепление, их расширяют пустыми сотами, магазинными надставками, закрывают кочевой сеткой (или редкой мешковиной), на которую кладут холстик, и ставят

граву, ветки, на ночь летки открывают полностью. Воду дают путем увлажнения холстиков или наливают в соты. Суточная потребность в воде до 1,5 литров.

- (вариант-2) отбор от пчелиных семей пчел-сборщиц. За 1 - 2 дня до обработки или массового цветения ядовитых растений ульи переставляют на новые места в пределах пасеки, а на освободившиеся подставки помещают пакетные ящики или улья с сотами и маткой в клеточке. После сбора летных пчел матку выпускают из клеточки, а пакеты или ульи убирают в прохладное место на 2 - 3 суток. Основным семьям и пакетам с летными пчелами дают по 0,5 - 1,0 кг медово-сахарного теста или 0,5 - 2 л сахарного сиропа. Гнезда основных семей сокращают и утепляют. Пакеты можно использовать для формирования безрасплодных отводков, усиления слабых семей и других целей.

- для сохранения пчел от отравления в течение одного дня, поступить так: рано утром семьи обеспечить водой, затем летки всех ульев прикрыть небольшими, рыхлыми пучками соломы, травы или сена, которые в течение дня систематически смачивать, не давая им высохнуть. Пчелы вылетают из улья в ограниченном количестве и основная масса их отравлению не подвергается.

- после окончания изоляции пчел, при случайном попадании пестицидов на пасеку, ульи обмыть снаружи водой с мылом.

- при проведении лечебно-профилактических мероприятий на пасеке соблюдать регламент применения (концентрация, доза, кратность, время, метод применения и срок годности) в соответствии с рекомендациями по использованию препаратов. Перед массовым применением препарат проверяют на безопасность для пчел сначала в 1-2 семьях, на 1-2 улочках с контролем за пчелами в течение 3-4 часов. Основной упор на лечение пчел химическими препаратами делать весной и первую половину лета, прекратить использование их за 30 дней до главного медосбора. Позднеосенние обработки против варроатоза (свыше 4% клеща) рассматривать как вынужденные.

Оздоровительные мероприятия:

При химическом токсикозе пчел в пораженных семьях гнезда сокращают и утепляют. Через несколько дней делают второе сокращение гнезда. В гнезде оставляют такое количество расплода, которое может быть покрыто пчелами. Из улья удаляют рамки с незапечатанным мёдом и пергой. Их перетапливают на воск, последний используют для технических целей. Слабые семьи, менее 6 улочек, объединяют, заменяют матку и не менее трети сотов отдают под расплод. В ослабленных семьях для подавления вирусной инфекции проводят опрыскивание сотов с пчелами раствором марганцевокислого калия (300-500 мг на 1 литр воды) из расчета 10-15 мл на сот.

Пострадавшим семьям дают теплый сахарный сироп (1,5 кг сахара на 1 л воды) с добавлением на 1 л 500 мг аскорбиновой кислоты и антибиотиков тетрациклинового ряда (400000 ед на 1 л). Подкормку дают не менее трех раз с интервалом 2-3 дня. На весь курс восстановительной терапии требуется 5-7 кг сахара на семью. Дополнительно под холстик кладут свежеприготовленное медово-сахарное тесто или помадку (мягкий канди).

При отравлении мышьяком на каждый литр сиропа добавляют по 10 мл 0,5% диализованной окиси железа.

Освободившиеся ульи очищают, промывают, дезинфицируют 3-5% раствором щелочи, выдерживают 12 часов, затем промывают водой и после просушки обжигают огнем газовой горелки до легкого побурения.

Изъятый из гнезд печатный мед обычно не содержит остатков яда и может быть использован для подкормки пчел в летнее время.


При хроническом токсикозе в зимне-весеннее время проводят сверххранний облет пчел и заменяют корм на доброкачественный.

Управление ветеринарии Пензенской области

Памятка владельцу пчел


В своей деятельности руководствоваться

ли 2.4, 2.5 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»,
инарными правилами содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства,
ия, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных
и получения продукции пчеловодства, утвержденными приказом Минсельхоза РФ от
6 № 194, Законом Пензенской области «О пчеловодстве» от 30.06.2009 № 1760-ЗПО



Обязательные требования

- На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт с соответствующими записями ветеринарной службы. на основании которых выдается разрешение на перевозку (кочевку), пересылку, продажу пчел и продукции пчеловодства.
- Пчелы подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учету в госветучреждении и администрации муниципального образования.
- Перед реализацией продукции пчеловодства необходимо проводить их ветеринарно-санитарную экспертизу в ветеринарных лабораториях госветучреждений.
- Пчеловод должен зарегистрироваться в ИС «Меркурий».
- При вывозе пчел на кочевку необходимо получить согласование государственной ветеринарной службы, встать на учет с учетом места кочевки (нанесение на карту нахождения пасеки).



Пчеловод должен знать



пчелосемей осуществлять только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. дощих ветеринарное благополучие территории.
ных пунктах количество пчелосемей не должно превышать 2 пчелосемей на 100 кв.м участка.
ие от границ соседних земельных участков – не менее 5 метров или без ограничений по расстояниям.
и наличие глухого забора (кустарника, строения высотой не мене 2 метров).
исполагают не ближе 100 м от соседних и железных дорог и 500 м от предприятий пищевой и
и промышленности.

ове пчел на медосбор улья размещать на расстоянии не менее 1,5 километров от ульев с пчелами.
ных другому хозяйству и не менее трех километров от пасек хозяйств.

ль диагностические исследования подбора пчел и обработки пчел против инфекционных и
их болезней пчел с занесением сведений в паспорт пасеки.
аболевания или гибели пчел пчеловод обязан сообщить об этом в _____ районную
о борьбе с болезнями животных по адресу: _____

телефон _____ Главный ветеринарный врач _____

(Ф.И.О.)



ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ